

Leflunomide medac - Potilastiedote

Hyvä potilas,

Sinulle on annettu tämä seloste, koska lääkärisi on määrännyt sinulle Leflunomide medacia. Lue tämä seloste huolellisesti läpi lääkepakkauksesta löytyvän potilastiedotteen lisäksi.

Toive saada lapsi ja raskaus

Kuten useimmat DMARD-lääkeryhmään (tautiprosessia hidastavat reumalääkkeet) kuuluvat valmisteet, Leflunomide medac saattaa vahingoittaa syntymätöntä lasta.

Tietoa hedelmällisessä iässä oleville naisille, jotka haluavat tulla raskaaksi

Syntymättömälle lapselle voi kehittyä vakavia vammoja

- jos otat Leflunomide medacia, vaikka olet raskaana.
- jos tulet raskaaksi Leflunomide medac -hoidon aikana.
- jos tulet raskaaksi ilman, että olet ensin lopettanut Leflunomide medac -hoidon ja käynyt läpi alla kuvatun menetelmän lääkkeen poistamiseksi elimistöstäsi.
- jos tulet raskaaksi kahden vuoden sisällä Leflunomide medac -hoidon lopettamisesta (ilman aikaisempaa lääkkeen poistamista elimistöstä).

Seuraavat varotoimet ovat erityisen tärkeitä Leflunomide medacia käytettäessä:

- Varmistu ennen hoidon aloittamista siitä, että et ole raskaana.
- Hedelmällisessä iässä olevien naisten on Leflunomide medacia ottaessaan käytettävä luotettavaa ehkäisyä, jota on käytettävä kahden vuoden ajan hoidon lopettamisen jälkeen.
- Mikäli suunnittelet raskautta, kerro siitä lääkäriille. Sinun on lopetettava Leflunomide medacin käyttö ja sinun on myös
 - odotettava 2 vuotta tai
 - suoritettava alla kuvattu lääkkeen poistamismenetelmä, jolla nopeutetaan Leflunomide medacin poistumista elimistöstäsi.
- Kerro lääkäriille välittömästi, jos epäilet olevasi raskaana (esim. jos kuukautistesi alkaminen on myöhässä) Leflunomide medac -hoidon aikana tai kahden vuoden sisällä hoidon lopettamisesta.

Leflunomide medac -hoidon jälkeinen lääkkeen poistamismenetelmä

Ennen kuin tulet raskaaksi, on sinun oltava täysin varma siitä, että Leflunomide medac on melkein täydellisesti poistunut elimistöstäsi. Tähän voi kulua jopa 2 vuotta. Tätä odotusaikaa voidaan lyhentää ottamalla eräitä lääkkeitä, jotka nopeuttavat Leflunomide medacin poistumista elimistöstäsi.

Kun näitä lääkkeitä on otettu 11 päivän ajan, on varmistettava vähintään 14 päivän välein otetuilla kahdella verikokeella, että vaikuttava aine on poistunut riittävästi elimistöstäsi. Heti kun verikoe osoittaa, että Leflunomide medac on poistunut elimistöstäsi, on sinun odotettava vielä ainakin kuukausi ennen raskaaksi tulemistä.

Mikäli lääkkeen pitoisuudet veressä ovat edelleen liian suuria, vielä poistamismenetelmän käytön jälkeenkin, voidaan menetelmä joutua toistamaan.

Tietoa miehille

On mahdollista, että Leflunomide medac kulkeutuu siemennesteeseen ja vahingoittaa syntymätöntä lasta. Tästä syystä miesten tulee käyttää luotettavaa ehkäisymenetelmää Leflunomide medacia ottaessaan.

Jos sinua hoidetaan Leflunomide medacilla ja suunnittelet perheenisäystä, ota yhteyttä lääkäriisi. Lääkäri voi neuvoa sinua lopettamaan Leflunomide medacin käytön ja suorittamaan yllä kuvatun elimistöstä poistamismenettelyn. Tämän jälkeen on varmistettava kahdella verikokeella kahden viikon välein siitä, että vaikuttavaa ainetta on poistunut riittävästi elimistöstäsi. Riskien minimoimiseksi sinun tulee sitten odottaa vielä ainakin 3 kuukautta ennen lapsen siittämistä.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen.

medac

Jorvas Hitech Center
Hirsalantie 11
02420 Jorvas

Puh 010 420 4000
Faksi 010 420 4009
info@medac.fi

www.medac.fi