

Leflunomida medac - Folheto para o Doente

Caro Doente

Este folheto contém informação de segurança sobre o medicamento Leflunomida medac que lhe foi receitado. Por favor, leia cuidadosamente todas as informações, assim como o Folheto Informativo que encontrará no interior da embalagem do medicamento.

Reprodução e gravidez

À semelhança da maioria dos outros MARMD (Medicamentos Antirreumáticos Modificadores da Doença), a Leflunomida medac pode ter efeitos nefastos para o bebé antes de nascer. A Leflunomida medac não pode ser tomada se está ou se pensa que pode estar grávida.

Informações para as mulheres com potencial para engravidar e que queiram ter um bebé

O seu bebé pode vir a nascer com graves deficiências se:

- Tomar Leflunomida medac e estiver grávida.
- Engravidar durante o tratamento com Leflunomida medac.
- Engravidar antes de acabar o tratamento com Leflunomida medac e de ter concluído o procedimento de eliminação abaixo descrito.
- Engravidar num período de 2 anos após o fim do tratamento com Leflunomida medac (sem um procedimento de eliminação anterior).

As seguintes precauções são muito importantes quando tomar Leflunomida medac:

- Antes de iniciar o tratamento, certifique-se de que não está grávida.
- As mulheres com potencial para engravidar têm de usar métodos contraceptivos seguros durante o tratamento com Leflunomida medac e nos 2 anos seguintes ao fim do tratamento.
- Se tenciona engravidar, informe o seu médico. Tem de parar de tomar Leflunomida medac e tem de:
 - esperar 2 anos ou
 - levar a cabo o procedimento de eliminação abaixo descrito para acelerar a remoção de Leflunomida medac do seu organismo.

- Informe imediatamente o seu médico se achar que pode estar grávida (por exemplo, se tiver um atraso na menstruação) durante o tratamento com Leflunomida medac ou nos 2 anos seguintes ao fim do tratamento.

Procedimento de eliminação após o tratamento com Leflunomida medac

Antes de engravidar tem de se certificar que já não tem resíduos de Leflunomida medac no seu organismo, o que pode demorar até 2 anos. Este período pode ser reduzido para 3 meses se efetuar um procedimento de eliminação (*wash out*) especial, que contribuirá para eliminar totalmente a Leflunomida medac do seu organismo.

A duração de um procedimento de eliminação (*wash out*) completo é, habitualmente, de 11 dias, após os quais são necessárias duas análises ao sangue com um intervalo entre si de duas semanas (14 dias). Estas análises dar-lhe-ão a certeza de que não resta qualquer medicamento no corpo.

Se os níveis sanguíneos continuarem demasiado elevados, mesmo depois do procedimento de eliminação, pode ser necessário repetir este procedimento.

Assim que as análises demonstrarem que Leflunomida medac foi eliminado, deve esperar mais um mês, pelo menos, antes de engravidar.

Para mais informações fale com o seu médico.

Informações para os homens

É possível que Leflunomida medac passe para o sémen e afete o feto. Por conseguinte, os homens devem usar métodos contraceptivos seguros, quando estiverem a tomar Leflunomida medac.

Se estiver a tomar Leflunomida medac e tenciona ser pai, contacte o seu médico. O seu médico aconselhá-lo-á a parar com o tratamento com Leflunomida medac e a realizar o procedimento de eliminação acima descrito. Depois disso, duas análises ao sangue, realizadas com um intervalo de pelo menos 14 dias, têm de confirmar que a substância ativa já foi suficientemente eliminada do seu organismo. Para minimizar os riscos, deve esperar mais 3 meses, pelo menos, antes de tentar ser pai.

Se tiver alguma dúvida, contacte o seu médico.