

## Leflunomide medac

### Pasientinformasjon

## Til pasienten

Du har fått denne brosjyren fordi legen din har forskrevet Leflunomide medac for deg. Les denne informasjonen grundig i tillegg til pakningsvedlegget som følger med medisinen.

## Ønske om barn og graviditet

I likhet med de fleste preparater i DMARD-gruppen (Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs), kan også Leflunomide medac være skadelig for det ufødte barnet.

## Informasjon til kvinner i fertil alder som ønsker å bli gravid

Det ufødte barnet kan utvikle alvorlige defekter hvis

- du tar Leflunomide medac mens du er gravid
- du blir gravid under behandling med Leflunomide medac
- du blir gravid uten først å ha stoppet behandlingen med Leflunomide medac og fullført utvaskingsprosedyren som er beskrevet i denne brosjyr
- du blir gravid innen 2 år etter at du har stoppet behandlingen med Leflunomide medac (uten en foregående utvaskingsprosedyre)

De følgende forsiktighetsreglene er spesielt viktige når du bruker Leflunomide medac:

- Før du starter behandlingen må du forsikre deg om at du ikke er gravid.
- Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon mens de tar Leflunomide medac, og i 2 år etter at behandlingen er stoppet.
- Hvis du planlegger å bli gravid, må du fortelle det til legen. Du må slutte å ta Leflunomide medac og du må
  - vente i 2 år eller
  - gjennomføre utvaskingsprosedyren som er beskrevet nedenfor, for å fremskynde fjerningen av Leflunomide medac fra kroppen.
- Si fra til legen umiddelbart hvis du tror du kan være gravid (f.eks. hvis menstruasjonen starter sent) under behandling med Leflunomide medac, eller innen 2 år etter at behandlingen er avsluttet.

## Utvaskingsprosedyre etter behandling med Leflunomide medac

Før du blir gravid, må du forsikre deg om at Leflunomide medac er nesten fullstendig fjernet fra kroppen din. Dette kan ta opptil 2 år. Denne ventetiden kan forkortes ved at du tar bestemte medikamenter som fremskynder fjerningen av Leflunomide medac fra kroppen.

Etter at du har tatt disse medikamentene i 11 dager, må det tas to blodprøver med minst 14 dagers mellomrom for å bekrefte at virkestoffet er tilstrekkelig fjernet. Etter at prøvene viser at Leflunomide medac er fjernet, må du vente minst én måned før du blir gravid.

Hvis blodnivåene fremdeles er for høye, selv etter utvaskingsprosedyren, kan det bli nødvendig å gjenta prosedyren.

## Informasjon for menn

Det er mulig at Leflunomide medac går over i sæd og skader det ufødte barnet. Derfor bør menn bruke sikker prevensjon mens de tar Leflunomide medac. Hvis du behandles med Leflunomide medac og planlegger å bli far, må du kontakte legen. Legen kan råde deg til å slutte og ta Leflunomide medac og utføre utvaskingsprosedyren som er beskrevet ovenfor. Deretter tas det 2 blodprøver med 2 ukers mellomrom for å bekrefte at virkestoffet er tilstrekkelig fjernet fra kroppen din. For å gjøre risikoen minst mulig bør du vente i minst 3 måneder til før du prøver å bli far.

Ta kontakt med legen hvis du har spørsmål.